

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УРОЛЕСАН® (UROLESAN)

Торговое название: Уролесан® (Urolesan)

Лекарственная форма: сироп

Состав:

100 мл сиропа содержат:

активные вещества: пихты масла – 0,419 г, мяты перечной масла – 0,105 г, моркови дикой плодов экстракта жидкого Extractum fructum Dauci sativi fluidum (1:1) (экстрагент 96% этанол) – 1,204 г, хмеля шишек экстракта жидкого Extractum fructum Strobili lupuli fluidum (1:1) (экстрагент 96% этанол) – 1,726 г, душицы травы экстракта жидкого Extractum herbae Origani fluidum (1:1) (экстрагент 96% этанол) – 1,195 мг;

вспомогательные вещества: полисорбат-80; кислота лимонная, моногидрат; кислота сорбиновая; сироп сахарный; динатрия эдетат; вода очищенная.

Описание: Жидкость светло-желтоватого цвета с зеленоватым оттенком, со специфическим запахом. Допускается опалесценция.

Фармакотерапевтическая группа: Средства, применяемые в урологии.

Код АТХ: G04B X.

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат растительного происхождения. Составляющие препарата Уролесан® уменьшают воспалительные явления в мочевыводящих путях и почках, способствуют усиленному кровоснабжению почек и печени, оказывают диуретическое, антибактериальное, желчегонное действие, образуют защитный коллоид в моче и нормализуют тонус гладкой мускулатуры верхних мочевых путей и желчного пузыря.

Уролесан® увеличивает выделение мочевины и хлоридов, способствует выведению мелких конкрементов и песка из мочевого пузыря и почек.

Фармакокинетика

Препарат хорошо всасывается, действие его начинается через 20-30 минут и продолжается 4-5 ч. Максимальный эффект наступает через 1-2 ч. Выводится через пищеварительный тракт и почками.

Показания к применению

Острые и хронические инфекции мочевыводящих путей и почек (циститы и пиелонефриты); мочекаменная болезнь и мочекислый диатез (профилактика образования конкрементов после их удаления); хронические холециститы (в том числе калькулезные), дискинезии желчных путей, желчекаменная болезнь.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь до еды.

Рекомендуемые дозы для взрослых: по 1 чайной ложке (5 мл) сиропа 3 раза в сутки. При острых состояниях (в т.ч. при почечной и печеночной коликах) продолжительность курса терапии составляет от 5 до 7 дней, при хронических состояниях – от 7 дней до 1 месяца. При возникновении почечной и печеночной колик разовую дозу можно однократно повысить до 2 чайных ложек (10 мл), затем на последующий прием вернуться к обычной разовой дозе (5 мл).

Рекомендуемые дозы для детей: 2-7 лет – по 2-4 мл 3 раза в сутки; 7-14 лет – по 4-5 мл 3 раза в сутки. Дозировка проводится с помощью шприца-дозатора.

Побочные эффекты

Обычно Уролесан® хорошо переносится. При применении препарата возможны:

- со стороны пищеварительного тракта: диспепсические явления (включая тошноту, рвоту);
- со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая чувство зуда, покраснение лица, кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек (чувство

- жжения во рту, затруднение дыхания, отек лица, языка), анафилактический шок;
- со стороны центральной и периферической нервной системы: головокружение, общая слабость, головная боль, атаксия, мышечный тремор;
- со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипертензия, гипотензия, брадикардия.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- дети с судорогами в анамнезе (фибрильными или нет).

Лекарственные взаимодействия

Не изучалось.

Особые указания

Не применять препарат в случае, если диаметр конкрементов превышает 3 мм.

Пациентам с сахарным диабетом, а также пациентам с повышенным содержанием глюкозы в крови необходимо быть осторожными, применяя Уролесан® (в состав препарата входит сахарный сироп). С осторожностью применять у больных бронхиальной астмой из-за риска возникновения бронхоспазма.

Применение в период беременности или кормления грудью. Применение препарата в период беременности или кормления грудью не изучалось.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не изучалось.

Дети. Препарат не применять детям до 2 лет.

Перед употреблением взбалтывать.

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте и не следует применять после истечения срока годности.

Передозировка

При передозировке возможны: тошнота, головокружение.

Лечение: обильное теплое питье, покой, активированный уголь, атропина сульфат (0,0005-0,001 г).

Форма выпуска: Сироп. По 90 мл в банках или флаконах или по 180 мл во флаконах, укупоренных крышками или колпачками алюминиевыми. Каждая банка или флакон вместе с инструкцией и шприцом-дозатором в пачке.

Условия хранения

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

После вскрытия хранить не более 28 суток при температуре от 2 °С до 8 °С.

Срок годности

2 года.

Условия отпуска аптек

Без рецепта.

Название и адрес изготовителя

ПАО «Галичфарм», Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковская, 6/8.

Наименование и адрес организации, принимающей претензии(предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан

Представительство корпорации «Артериум» в Республике Узбекистан, 100 000, г.Ташкент, ул. Мустакиллик, д. 59.

Тел.:+99871 237-51-53

Факс:+ 99871 237-51-54

e-mail: Tashkent@arterium.ua